


# Administer l'artésunate par voie rectale et transférer l'enfant

## Âge

Pour les enfants de 6 mois à moins de 6 ans.



## Signes de gravité nécessitant l'artésunate par voie rectale

Si en plus de la fièvre, en cours ou passée, vous remarquez un ou plusieurs de ces signes de gravité, administrez l'artésunate par voie rectale.



LÉTHARGIE/INCONSCIENCE




REFUS DE S'ALIMENTER



CONVULSIONS



VOMISSEMENTS RÉPÉTÉS



Fièvre:  
37.5°C  
ou plus

## ÉTAPE 1: Administrez l'artésunate par voie rectale



## ÉTAPE 2: Transférez l'enfant

Après avoir reçu le suppositoire d'artésunate rectal, l'enfant doit être emmené **immédiatement** au centre de santé ou à l'hôpital le plus proche, où un traitement complet pour le paludisme grave pourra être administré.



# Administer l'artésunate rectal pour le paludisme grave: 4 étapes

## 1 Préparez

Pesez le patient ou estimez son poids




Vérifiez le dosage en fonction de l'âge et du poids de l'enfant

Âge	plus de 6 mois à moins de 3 ans	plus de 3 ans à moins de 6 ans
Fourchette de poids	De 5 kg à moins de 14 kg	De 14 kg à 20 kg
Dose 10 mg/kg	1 suppositoire (1 x 100 mg)	2 suppositoires (2 x 100 mg)

Lavez-vous les mains



Enfilez une paire de gants jetables



Placez l'enfant dans la position latérale



## 2 Administrez

Jetez l'emballage et introduisez le suppositoire



Introduisez le suppositoire



Serrez les fesses de l'enfant



**IMPORTANT:**



Si le suppositoire est cassé ou fondu, introduisez-en un autre.



Si le suppositoire ressort :  
• S'il est intact, réintroduisez-le.  
• S'il est en morceaux ou partiellement fondu, introduisez-en un nouveau.


## 3 Transférez

l'enfant au centre de santé ou à l'hôpital le plus proche où il recevra un traitement complet. L'artésunate par voie rectale n'est que la première étape du traitement.

Complétez le formulaire de transfert



Où devez-vous transférer l'enfant ?



Transport urgent



## 4 Surveillez

Revoyez l'enfant au bout de quelques heures pour vous assurer qu'il a bien été emmené au centre de santé ou à l'hôpital le plus proche. Après le retour de l'enfant, revoyez-le au moins une fois par semaine pendant un mois, jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri.

