


# Administrar artesunato rectal e transferir

## Idade

Para crianças entre 6 meses e menos de 6 anos de idade



## Sinais de perigo que necessitam artesunato rectal

Se além da febre ou história de febre, notar um ou mais destes sinais de perigo, administre artesunato rectal.



LETARGIA/PERDA DE CONSCIÊNCIA




RECUSA A ALIMENTAR-SE



CONVULSÕES



VÔMITOS REPETIDOS



## PASSO 1: Administrar artesunato rectal



## PASSO 2: Transferir

Depois de receber o supositório de artesunato rectal por via rectal a criança deve ser **imediatamente** transferida para o hospital ou unidade sanitária mais próxima, onde o tratamento para a malária grave pode ser administrado.





# Administrar artesunato rectal para malária grave: 4 passos

## 1 Prepare

Pese a criança ou estime o peso aproximado




Verifique a dose tendo em conta a idade e o peso da criança

Idade	Dos 6 meses a menos de 3 anos	Dos 3 anos a menos de 6 anos
Peso	Dos 5 kg a menos de 14 kg	Dos 14 kg a 20 kg
Dose 10 mg/kg	1 supositório (1 x 100 mg) 	2 supositórios (2 x 100 mg) 

Lave as mãos



Use luvas descartáveis



Coloque a criança em posição lateral



## 2 Administre

Retire o supositório da embalagem e introduza



Introduza o supositório



Junte as nádegas



Solucione problemas:



Se o supositório se partir ou derreter, introduza um novo supositório.



Se o supositório sair:

- Se está inteiro, volte a introduzir o mesmo.
- Se está partido ou derreteu introduza um novo supositório.


## 3 Transfira

Para o hospital ou unidade sanitária mais próxima, onde a criança receberá o tratamento completo. O artesunato por via rectal é apenas o primeiro passo do tratamento.


Preencha a Guia de Transferência



Para onde transferir?



Transporte com urgência



## 4 Seguimento

Faça o seguimento dentro de algumas horas para se assegurar que a pessoa que cuida da criança foi de facto ao hospital ou unidade sanitária mais próxima com a criança.

Quando a criança voltar, observe-a pelo menos uma vez por semana durante um mês até que a criança esteja totalmente recuperada. Pergunte se a criança tem apetite. Verifique o seu estado geral, se está anémica ou febril.

