

FORMULAIRE D'ÉVALUATION DE LA CPS

NOM

DATE

INSTRUCTIONS

Pour chaque question, mettre une croix dans la case à côté de la bonne réponse. Une seule croix par question.

Q1 QUE SIGNIFIENT LES INITIALES SP ?

- R1 Sulfadoxine Piperaquine Sulfadoxine pyriméthamine Sulfadoxine proguanil

Q2 QUE SIGNIFIENT LES INITIALES AQ?



- R2 Artémisinine quinine Artésunate quinine Amodiaquine Atovaquone

Q3 LA CPS EST DESTINÉE AUX ENFANTS DE QUEL AGE ?

- R3 0-59 mois 3-59 mois 12-59 mois 12-71 mois

Q4 QUELLE QUANTITÉ DE MÉDICAMENT FAUT-IL DONNER À UN ENFANT DE 3-11 MOIS ?

- R4 250/12,5 mg de SP et 75 mg d'AQ base une fois par jour pendant 3 jours Une dose unique de 250/12,5 mg de SP au Jour 1 et 75 mg d'AQ base 1 fois par jour pendant 3 jours Une dose unique de 500/12,5 mg de SP au Jour 1 et 75 mg d'AQ base 1 fois par jour pendant 3 jours



Q5 QUELLE QUANTITÉ DE MÉDICAMENT FAUT-IL DONNER À UN ENFANT DE 12-59 MOIS ?

- A5 Une dose unique de 500/25 mg de SP et 153 mg d'AQ base une fois par jour pendant 3 jours Une dose unique de 250/12,5 mg de SP au Jour 1 et 153 mg d'AQ base 1 fois par jour pendant 3 jours Une dose unique de 500/25 mg de SP au Jour 1 et 75 mg d'AQ base 1 fois par jour pendant 3 jours



Q6 A QUI NE FAUT-IL PAS DONNER DE CPS ?

- R6** Enfant souffrant d'une maladie aiguë ou incapable de prendre un médicament par voie orale
- Enfant qui a reçu une dose d'AQ ou de SP au cours des 30 derniers jours
- Enfant de moins de 3 mois
- Enfant séropositif pour le VIH recevant du cotrimoxazole
- Enfant allergique à l'un des deux médicaments (AQ ou SP)
- Enfant de moins de 5 kg
- Tous les cas cités

Q7 QUELS SONT LES BÉNÉFICES ATTENDUS DE LA CPS ?

- R7** Prévient la plupart des cas de paludisme, et diminue probablement le nombre de cas d'anémie sévère
- Prévient la plupart des cas de paludisme, diminue probablement le nombre de cas d'anémie sévère, et est associé à très peu d'événements indésirables graves
- Diminue probablement le nombre de cas d'anémie sévère, et est associé à très peu d'événements indésirables graves

Q8 QUAND FAUT-IL ADMINISTRER LA CPS ?

- R8** Tous les mois avant la saison des pluies, lorsque l'incidence du paludisme est élevée
- Une fois pendant la saison des pluies, lorsque l'incidence du paludisme est élevée
- Tous les mois pendant la saison des pluies, lorsque l'incidence du paludisme est élevée

Q9 QUE FAUT-IL FAIRE SI UN ENFANT VOMIT ?

- R9** Si un enfant vomit, crache ou régurgite le médicament, il ne faut pas donner une deuxième dose
- Si un enfant vomit, crache ou régurgite le médicament dans les 5 minutes, il faut le laisser récupérer pendant environ 10 minutes et ensuite lui donner une dose de remplacement

Q10 SI UN ENFANT VOMIT UNE DEUXIÈME FOIS, FAUT-IL LUI REDONNER UNE DOSE DE REMPLACEMENT ?

- R10** Oui Non

Q11 IFSI UN ENFANT EST PRÉSENTÉ À LA CLINIQUE PARCE QU'IL A RATÉ UN CYCLE DE TRAITEMENT LE MOIS PRÉCÉDENT ?

- R11** Il faut traiter l'enfant s'il est présent et en bonne santé
- Il ne faut pas administrer de CPS à cet enfant.
- Il faut traiter l'enfant s'il est présent

Q12 QUELS SONT LES MESSAGES LES PLUS IMPORTANTS QUE L'ASC PUISSE DONNER AUX SOIGNANTS ?

- R12** Il faut donner un comprimé à l'enfant aux Jours 2 et 3
- Il faut donner à l'enfant le comprimé qui correspond à son âge, aux Jours 2 et 3, et signaler tous les événements indésirables
- Il faut donner un comprimé à l'enfant (la dose à donner dépend de l'âge de l'enfant) aux Jours 2 et 3, revenir un mois plus tard pour un nouveau cycle de traitement et signaler tous les événements indésirables